



Dr. Fridleif Bachner  
Schwabstraße 18  
D-70197 Stuttgart

---

**Erklärung zur Narkosefähigkeit – Empfehlung für Hausärzte und Überweiser der Praxis Dr. Bachner**

---

Sehr geehrte Kollegin, Sehr geehrter Kollege,

bei unserem gemeinsamen Patienten ist ein kieferchirurgischer Eingriff geplant.

Dieser Eingriff soll in  Lokalanästhesie  Vollnarkose erfolgen  
Art des Eingriffes: \_\_\_\_\_

Wir möchten Sie bitten, die Narkosefähigkeit unseres Patienten schriftlich zu bestätigen, und gegebenenfalls folgende Untersuchungen zu veranlassen.

Für Patienten ab einem Alter von 50 Jahren nach Ihrem Ermessen ein Standard-EKG, bei Patienten ab dem 60 Lebensjahr ggf. ein Röntgen-Thorax. Kleines Blutbild (incl. Leukozyten, Thrombozyten, Natrium, Kalium i.S., Blutzucker, Gerinnungstests mit Quick (INR) und PTT).

Verfügen Sie über Befunde aus jüngerer Zeit, so geben Sie diese bitte Ihrem Patienten zur Anästhesieaufklärung mit.

Da es bei kieferchirurgischen Eingriffen bei der Einnahme von Antikoagulantien häufig zu Nachblutungen kommt, sollten diese Präparate entweder abgesetzt oder auf Heparinpräparate umgestellt werden. Dies gilt insbesondere bei der Einnahme von Marcumar. Bitte beachten Sie die vergleichsweise langen Halbwertszeiten der „modernen“ Antikoagulantien, wie Clopidogrel, Ticlopidin und Fondaparinux.

Bei Diabetikern sollten metforminhaltige/sulfonylharnstoffhaltige Präparate vor OP abgesetzt werden, da lebensgefährliche Laktatazidosen beobachtet wurden.

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und Ihre Bemühungen, alle Empfehlungen entsprechen den Standards der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen Ihr Dr. F. Bachner

Der oben genannte Patient ist narkosefähig / ist mit folgenden Einschränkungen narkosefähig:

---

---

---

---

Ort, Datum, Praxisstempel

Unterschrift